

VectoBac® DT

Insetticida biologico in tavolette effervescenti pronte all'uso contro le larve di zanzara.
Presidio Medico-Chirurgico - Registrazione n. 18670 del Ministero della Salute

Composizione

100 g di prodotto contengono

Bacillus thuringiensis var. *Israelensis* sierotipo (H-14) g 3,4

Ingredienti inerti q.b. a 100

Potenza 3400 U.T.I. / mg di formulato

Caratteristiche

VectoBac DT è un larvicida il cui principio attivo è rappresentato da una tossina naturale ad azione altamente selettiva nei confronti di numerose specie di larve di zanzare, comprese le larve di zanzara tigre, ed efficace in diversi ambienti di applicazione.

Tra i generi di zanzare controllati da VectoBac DT vi sono: *Aedes*, *Anopheles*, *Culex*, ecc.

VectoBac DT è efficace contro tutti gli stadi di sviluppo larvale delle suddette specie.

Quando la tossina viene ingerita dall'insetto, si scinde all'interno dell'intestino; segue la paralisi e successivamente la morte. L'effetto larvicida di VectoBac DT si manifesta molto rapidamente, in genere nell'arco di 12-18 ore dall'applicazione.

VectoBac DT è indicato per il trattamento dei focolai larvali in acque stagnanti non luride quali bacini di raccolta dell'acqua, caditoie stradali, tombinature varie.

E' indicato inoltre per il trattamento delle vasche di raccolta dei liquami, oltre che per applicazioni in fontane, in piccoli specchi d'acqua e nei sottovasi.

Modalità di impiego: una singola tavoletta di VectoBac DT è sufficiente per trattare fino a 50 litri d'acqua. Per quantitativi più elevati, usare proporzionalmente un numero maggiore di tavolette.

Nel caso si debbano trattare quantità d'acqua di dimensioni particolarmente ridotte, VectoBac DT può essere sciolto in acqua in ragione di una tavoletta in 1 litro d'acqua. La soluzione ottenuta può poi essere applicata con varie apparecchiature erogatrici, dalle apparecchiature erogatrici da terra, alla pompa a spalla, all'annaffiatoio: 1 litro di soluzione è sufficiente per trattare circa 10 mq di acqua stagnante.

In caso di predominanza di larve al 3° stadio di sviluppo o nella fase precoce del 4° stadio, in caso di densità di popolazione elevata, o di ambiente idrico fortemente inquinato (ad esempio vasche di raccolta dei liquami o di altri effluenti) o di abbondante presenza di alghe, è opportuno raddoppiare il dosaggio di impiego.

VectoBac DT va applicato da aprile ad ottobre, ripetendo il trattamento ogni 7-14 giorni in dipendenza delle condizioni ambientali e climatiche.

VectoBac DT è innocuo verso l'uomo, la flora, i pesci, gli animali domestici e gli insetti non target, compresi gli insetti utili.

VectoBac DT può essere conservato a temperatura ambiente e la sua efficacia è garantita per 2 anni dal momento del confezionamento.

Avvertenze:

Conservare fuori della portata dei bambini e degli animali domestici. Conservare lontano da alimenti o mangimi e bevande. Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Se vi è stato contatto con gli occhi,

risciacquarli abbondantemente con acqua a scopo cautelativo. In presenza di irritazione consultare il medico. Da non impiegarsi in agricoltura. Preservare dal gelo. Conservare il prodotto nel suo imballo originale e sigillato e in luogo fresco ed asciutto.

Confezioni:

Bustina con blister da 10 compresse.

Note:

E' un insetticida. Leggere attentamente le avvertenze.

Quanto riportato sulla presente scheda è conforme all'etichetta approvata dal Ministero della Salute. Informazioni riservate ai tecnici dei settori biocidi e protezione delle piante ed alle Autorità Sanitarie.

